

Đau đớn bụng bên trái cảnh báo căn bệnh gì?

Căn bệnh dạ dày, sỏi thận, nhiễm trùng ruột thừa, viêm loét đại tràng có khả năng dẫn tới đau đớn âm ỉ, quặn đả cơn tại vùng bụng bên trái.



Theo BS Lương T.Phương Nam, phòng khám đa khoa Hưng Thịnh Hà Nội, đau bụng bên trái là dấu hiệu tập trung của rất nhiều lần bệnh tiêu hóa. Tùy đả từng bệnh, cơn đau có các bản chất không giống nhau.

Đau đớn bụng bên trái cảnh báo căn bệnh gì?

Sau đây là một vài căn bệnh về dạ dày, đường ruột có thể làm cho bụng bên trái đau.

Nhiễm trùng ruột thừa dẫn tới đau quanh rốn hay thượng vị. Dưới 6-12 tiếng, cơn đau chuyển xuống khu vực bụng dưới bên trái. Biểu hiện đau đớn dữ dội, co cứng thành bụng tiến triển trầm trọng theo thời gian. Người có khả năng chán ăn, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, sốt Trên đây 39 độ. Nhiễm trùng ruột thừa là mức độ cấp cứu khẩn cấp, cần thiết được phát hiện và giải phẫu sớm, tránh đe dọa tới tính mạng.

Viêm nhiễm túi thừa thực hiện phù nề ở các mô xung quanh. Căn bệnh thường gặp ở người Trên 40 độ tuổi, triệu chứng gồm đau vùng bụng bên trái, đầy hơi, buồn nôn, sốt, co thắt dạ dày và thay đổi thói quen đại tiện.

Nghỉ ngơi kết hợp dùng thuốc giúp kiểm soát triệu chứng, một số trường hợp nghiêm trọng cần thiết phẫu thuật.

Viêm dạ dày ruột cũng dẫn đến đau bụng bên trái, kèm tiêu xuất, đại tiện ra máu, buồn nôn, ói mửa, ăn mất đi ngon, đau nhức cơ bắp... Bệnh tiếp diễn do virus, vi khuẩn hoặc ký sinh trùng làm theo viêm ruột, dạ dày hoặc bên cạnh đó cả hai cơ quan.

Hòn thận làm theo tắc nghẽn vận chuyển nước tiểu, khiến cho bụng bên trái đau đốn. Cơ đau thường lan dần xuất sau lưng hoặc khu vực bụng sau, một số tình huống thực hành thương tổn cơ quan sinh dục. Đau bụng bởi viêm thận thường kéo dài 20-60 phút, cơn đau quặn, suy nhược Sau đó tái nhiễm. Biểu hiện không giống ví dụ buồn nôn, bí tiểu, không dễ dàng tiểu, tiểu tiện ra máu, nhói đau khi đi đại...

Đối tượng thường được chỉ định uống kháng sinh giảm sút đau, kháng sinh ngăn ngừa viêm hoặc thuốc ví như tiếp diễn viêm hệ đào thải niệu. Trường hợp trầm trọng nên thực hành tán cục hay tiểu phẫu.

Nhiễm trùng loét đại tràng, bệnh Crohn cũng có dấu hiệu này. Bệnh dẫn đến sưng, đỏ lớp niêm mạc bên trong tràng tiêu hóa. Bệnh nhân có thể mắc phải đầy khá, tiêu ra kèm huyết, buồn nôn, ói mửa, sốt, ớn lạnh... Tùy lên cấp độ bệnh, bác sĩ có khả năng chỉ định uống thuốc kháng sinh giảm sút viêm nhiễm, đổi thay chế độ dinh dưỡng hay tiểu phẫu để kiểm chế tổn thương.

Theo bác sĩ Phương Nam, người bệnh nên ghi lại biểu hiện cơn đau thí dụ đau đốn quặn hay âm ỉ, cường độ đau đốn, khi khởi phát, đau chỗ trú luôn lan sang khu vực khác, biểu hiện bất hay kèm theo như nôn, sốt để phân phối giúp chuyên gia trong quá trình cảm nhận. Người bệnh cần thiết đi thăm khám sớm giả dụ bắt gặp đau bụng bên trái kéo dài hoặc kèm đau đốn ngực, khó thở, sốt cao, nôn, đại tiện ra huyết, đau đốn bụng dữ dội, vàng da, sụt cân bất thường...

Để phòng ngừa những bệnh Vừa rồi, cần phải xây dựng thói quen sống và chế độ sinh hoạt thích hợp, lành mạnh đó là sử dụng đủ nước mỗi ngày, tập thói quen đi đi ngoài thường xuyên, ăn trễ nhai kỹ, chia bé những bữa ăn, tập thể thao liên tục.

- [Khám phụ khoa](#)
- [Chi phí thông tắc vòi trứng](#)
- [Tư vấn nam khoa trực tuyến](#)
- [Chữa xuất tinh sớm ở đâu](#)

- [Đốt viêm lộ tuyến cổ tử cung bao nhiêu tiền](#)
- [Chữa bệnh yếu sinh lý ở đâu](#)
- [Chữa rối loạn cương dương](#)
- [Chi phí khám nam khoa](#)
- [Bảng giá khám phụ khoa](#)
- [Vùng kín nổi mụn không đau](#)
- [Địa chỉ phòng khám nam khoa](#)
- [Địa chỉ phá thai an toàn](#)